



마약류 이용 성범죄 예방
[피해가 의심된다면 112]

마약류 이용 성범죄

잠시 자리를 비운 사이, 당신의 술잔은 안전한가요?



마약류 이용 성범죄 피해자 증상 알아보기

GHB(일명 물뽕)

- 대표적인 성범죄 이용 약물로 복용 10~20분 이내 시작되어 의식소실, 환각, 호흡곤란 등의 증상이 평균 4시간 지속
- 대화하거나 질문에 대답하다가 잠들며, 깨어난 후 전혀 기억하지 못함

졸피뎀 등 수면제류

- 몸에 힘이 없이 심한 졸음이 오고, 피해 전·후 기억하지 못함
- 술, 커피를 마신 후 곧바로 정신을 잃고 잠들었다가 4시간 후에 깨어남
- 입에서 쓴맛이 나고, 몸에 힘이 하나도 없이 축 처짐 (수면내시경 후 느낌)

메스암페타민(필로폰)

- 어지럼증 등 빈혈 증세, 몸에 힘이 빠짐, 가슴통증과 답답함 호소
- 주로 정맥주사로 투여하나 술, 음료를 통한 흡수는 느린편
- 머리가 어지럽고 춥거나 열이 나는 느낌, 몸이 마음대로 움직이지 않음
- 뜨거운 느낌이 나고, 쇠맛이 나며 심장박동수가 빨라짐

Caution!



특수한 환경에 노출되지 않고도 일상생활에서 쉽게 피해 발생

최근 마약범죄가 사회적 이슈로 떠오르며,
마약을 이용한 성범죄에 대한 불안감도 높아지고 있는 상황입니다.
마약 특성상 피해 당시 피해자의 인지가 불분명하고,
피해 이후에도 약 기운이 지속되어 인지가 낮아지는 등
표면적인 실태가 드러나기 어렵습니다.
피해증상과 대처법을 통해 적극적인 예방이 필요한 이유입니다.



성범죄 이용 약물?

성범죄를 목적으로 피해자의 의식을 잃게 하거나 기억력을 상실시키는 등 저항할 수 없는 상태로 만들기 위해 사용되는 약물 (비교적 단시간 내에 체내에서 반출되며, 무색·무취로 음료에 용해하는 경우 식별이 어려움)

성범죄 이용 마약류의 체내 잔류시간

GHB 등 마약류는 몸에서 빨리 사라질 수 있어 마약류별 체내 잔류시간 이내
즉시 신고해서 신속하게 증거 채취할 수 있도록 해야합니다 (소변검사 기준)

GBH(물봉)



24시간

수면제류(졸피뎀)



72시간

필로폰



1~7일

※ 복용량, 종류, 개인특성에 따라 약물 검출 가능 시간이 다르므로, 장기간(1개월) 경과하지 않았다면 검사의뢰가 가능합니다.
(모발은 약물이 모발로 이행되는 시간을 고려해 5~7일 이후에 검출 가능)

마약류 이용 성범죄 예방방법

- ✓ 마약섭취가 의심이 된다면, 즉시 112 신고하기
- ✓ 마약을 이용한 성폭력 피해가 의심된다면,
피해 당시 마시던 음료 등 증거 보존하기
- ✓ 개인적으로 채취한 소변 등은 증거채택이 어려우므로
경찰의 도움받기
- ✓ 일방적인 마약투약 피해시, 보호받을 수 있음을 명심

마약류 이용 성범죄 대처요령

피해를 입거나,
피해가 의심된다면?



증거보존

마시던 음료 등은 보존,
소변을 보거나
몸을 씻지 않습니다.



신고하기

경찰서 신고 **112**
가까운 경찰서에
방문신고 합니다.

비자발적 마약 복용은 처벌받지 않습니다.